

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書ガスター10[®]

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ガスター10（錠／散／S錠／内服液）
2	成分・分量	1（錠／包／錠／本）中 ファモチジン 10 mg
3	用法・用量	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれた時、成人（15～80 歳未満）1回量 1（錠／包／錠／本）を服用して下さい。1日服用回数 2回まで。 ・服用後 8 時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう 1（錠／包／錠／本）服用して下さい。 ・症状が治まった場合は、服用を止めて下さい。 ・3 日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談して下さい。 ・2 週間を超えて続けて服用しないで下さい。
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。</p> <p>(1) ファモチジン等の H₂ ブロッカー薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2) 医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。 血液の病気、腎臓・肝臓の病気、心臓の病気、胃・十二指腸の病気、喘息・リュウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤</p> <p>(3) 医師から赤血球数が少ない、血小板数が少ない、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。</p> <p>(4) 小児（15 歳未満）及び高齢者（80 歳上）</p> <p>(5) 妊婦または妊娠していると思われる婦人並びに授乳婦。 ※フェニルケトン尿症の人。←この項はガスター10S錠のみ</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 他の胃腸薬 次に該当する人はお申し出下さい。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人または他の医薬品を服用している人。</p> <p>(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。</p> <p>(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(4) 高齢者。</p> <p>(5) 次の症状のある人。のどの痛み、咳および高熱、原因不明の体重減少、持続性の腹痛</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。