

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ファモチジン錠「クニヒロ」



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ファモチジン錠「クニヒロ」
2	成分・分量	1錠中 ファモチジン 10mg
3	用法・用量	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれたとき、成人（15歳以上80歳未満）1回量1錠を服用してください。1日服用回数は2回（2錠）まで。 <ul style="list-style-type: none"> 服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1錠服用してください。 症状が治まった場合は、服用を止めてください。 3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師または薬剤師に相談してください。 2週間を超えて続けて服用しないでください。 15歳未満および80歳以上の方は服用しないでください。
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき （本剤は、胃のヒスタミンH ₂ 受容体に拮抗する薬を含んでいます）
5	保健衛生上の危害を防止するために	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください。 <ol style="list-style-type: none"> ファモチジン等のH₂ブロッカー薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。血液の病気、腎臓・肝臓の病気、心臓の病気、胃・十二指腸の病気、ぜんそく・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤 医師から赤血球数が少ない、血小板数が少ない、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。 小児（15歳未満）および高齢者（80歳以上）。 妊婦または妊娠していると思われる人。 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の胃腸薬 次に該当する人はお申し出ください。 <ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人または他の医薬品を服用している人。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 高齢者。 次の症状のある人。のどの痛み、咳および高熱、原因不明の体重減少、持続性の腹痛
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。