

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

アレルビ



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	アレルビ
2	成分・分量	1日量(2錠)中 フェキソフェナジン塩酸塩 120mg
3	用法・用量	成人(15歳以上)、1回1錠、1日2回朝夕に水またはお湯でかまずに服用してください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
5	保健衛生上の危害を防止するために	<ol style="list-style-type: none">次の人は服用しないでください。 (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)15歳未満の小児。本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等)、制酸剤(水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤)、エリスロマイシン服用前後は飲酒しないでください。授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 (動物試験で乳汁中への移行が認められています。) 次に該当する人はお申し出ください。 <ol style="list-style-type: none">医師の治療を受けている人。アレルギー性鼻炎か、かぜ等他の原因によるものかわからない人。気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。鼻づまりの症状が強い人。妊婦または妊娠していると思われる人。高齢者。薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。