

販売元： 大正製薬株式会社
製造販売元：バイエル薬品株式会社

クラリチンEX

アレルギー専用鼻炎薬

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

クラリチン[®]EX



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	クラリチンEX
2	成分・分量	1錠中 ロラタジン 10mg
3	用法・用量	成人（15才以上）、1回1錠、1日1回食後に服用してください。 なお、毎回同じ時間帯に服用してください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： 鼻みず、鼻づまり、くしゃみ
5	保健衛生上の危害を防止するために	<ol style="list-style-type: none">次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 15才未満の小児。本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）、 エリスロマイシン、シメチジン服用前後は飲酒しないでください授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください次に該当する人はお申し出ください<ul style="list-style-type: none">医師の治療を受けている人。次の診断を受けた人。 肝臓病、腎臓病、てんかんアレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人。気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。妊婦又は妊娠していると思われる人。高齢者。薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。