

## 要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書クリニカ  
フッ素メディカルコート

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	クリニカ フッ素メディカルコート						
2	成分・分量	(1mL 中) フッ化ナトリウム 0.5mg						
3	用法・用量	<p>次の1回量を用いて1日1回食後又は就寝前に洗口（ブクブクうがい）します。</p> <table border="1"> <tr> <td>年齢</td> <td>4才以上</td> <td>4才未満</td> </tr> <tr> <td>1回量</td> <td>5～10mL</td> <td>×</td> </tr> </table> <p>※1回量は、年齢等による口腔の大きさを考慮し、通常4～5才で5mL、6才以上で7～10mLです。          &lt;洗口方法&gt; 本剤1回量を口に含み、歯面に十分ゆきわたるように30秒から1分間洗口（ブクブクうがい）し、吐き出します。（上を向いたガラガラうがいをしない）</p> <p>&lt;用法・用量に関連する注意&gt;</p> <p>(1) 飲みこまないでください（内服液ではありません。）。</p> <p>(2) 定められた用法・用量を厳守してください。</p> <p>(3) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとでご使用ください。</p> <p>(4) ガラガラうがいではなく、飲みこまないように注意して、洗口（ブクブクうがい）をしてください。</p> <p>(5) 低年齢児や要介護の方、洗口の経験の少ない方は、水で洗口（ブクブクうがい）の練習を行い、確実に吐き出せることを確認してからご使用ください。</p> <p>(6) 必ず本品に付属しているプラスチック製計量キャップを使用し、1回量は一度に口に含んでください。</p> <p>(7) 使用後は口を水などですすがず、また30分間は飲食しないでください（有効成分が口腔内から洗い流され、効果が低減するおそれがあります。）。</p> <p>(8) 誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれた場合には、牛乳（無い場合は水）をコップ1～2杯程度摂取し、医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。（嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状をやわらげる効果があります。なお、少量飲んだとしても、これらの症状があらわれない場合は、この処置は必要ありません。）</p>	年齢	4才以上	4才未満	1回量	5～10mL	×
年齢	4才以上	4才未満						
1回量	5～10mL	×						
4	効能・効果	ムシ歯の予防						
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>■次の人は使用しないでください。</p> <p>(1) 4才未満の乳幼児。</p> <p>(2) 洗口（ブクブクうがい）ができない人。</p> <p>(3) 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>※次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。          薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p>						
6	薬剤師が必要と判断する事項							

## 〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。