

販売元：(株)メイクトモロー  
製造販売元：キクリウ製薬(株)

オノック

精力剤（テストステロン配合＜塗布剤＞）

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

# オノック



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	オノック
2	成分・分量	該当医薬品の成分及び分量(1g中) テストステロン…………… 10.0mg 酢酸dI- $\alpha$ -トコフェロール…………… 10.0mg アミノ安息香酸エチル…………… 100mg 塩酸ジフェンヒドラミン…………… 5.0mg 添加物としてステアリール・ポリオキシチエチレン・硬化ヒマシ油・メチルパラベン・プロピルパラベンを含む
3	用法・用量	<ul style="list-style-type: none"><li>● 早漏防止の場合：性行為の20分～30分前に、0.1g(小豆大・小指第一関節の半分程度)を亀頭部(尿道口を除く)によくすりこむように塗布し、塗布後10分～20分経過後、塗布した部分を洗い流す、またはよく拭き取る。性行為の際はコンドームのご使用をお勧めします</li><li>● 勃起力減退・精力減退の症状改善の場合：亀頭部(尿道口を除く)または陰囊(睾丸)を清潔にし、1日1回、0.1g(小豆大・小指第一関節の半分程度)を、よくすりこむように塗布する。症状が好転したら隔日にする</li></ul>
4	効能・効果	男子更年期以降における次の諸症・男性性器神経衰弱症(早漏・勃起力減退・性器不全・性感減退・遺精・精液漏)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 次の人は使用できません</li><li>1. 前立腺肥大・前立腺腫瘍(悪性)のある方</li><li>2. 塗布する場所または局所に、傷、炎症、かゆみ、湿疹のある方</li><li>3. 本剤を少量出し、内股などの皮膚の薄い箇所にすり込んで、翌日に、発赤・発疹・炎症・かゆみ等が現れる方</li><li>4. 同じ成分を含んだ医薬品を使用している場合</li><li>5. 小児・妊婦又は妊娠の可能性がある方</li></ul> 次の部位には使用しないで下さい。 ① 顔(目と目の周囲・鼻・口の周囲等) ② 陰茎部先端(尿道口) ○その他の注意事項 * 内服用に使用しないで下さい。 * 本剤を使用している間は男性ホルモンを含んだ他の医薬品を使用しないこと ○ 医師又は薬剤師に相談してください。 1. 現在、医師の治療を受けている方 2. 本品を2ヶ月程度使用して、症状が好転しない場合 3. 本品を長期連用(6ヶ月以上)の方 4. 薬剤でのアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を、おこした人
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。