

販売元：大正製薬(株) 製造販売元：ゲラク・スミスカイン(株)	シガノンCQ1	禁煙補助剤
------------------------------------	---------	-------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための 説 明 文 書

シガノンCQ1



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	シガノンCQ1
2	成分・分量	薬物貯蔵層100g 中 ニコチン 40g (シガノンCQ1：1枚中 ニコチン 78mg)
3	用法・用量	胸、背中、腕のいずれかを選び、次の期間1日1回1枚を起床時に貼付し、就寝前にはがしてください。なお、貼付部位は毎日変えてください。 シガノンCQ1：最初の6週間 シガノンCQ2：次の2週間 ただし、シガノンCQ1を6週間貼付後、禁煙時のイライラなどの症状がなくなり、禁煙継続に自信がある場合は、シガノンCQ2を使用しなくてもよいです。
4	効能・効果	禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために	- 次の人は使用しないでください - 非喫煙者。 - 現在、他のニコチン製剤を使用している人。 - 妊婦、授乳婦又は妊娠していると思われる人。 - 重い心臓病を有する人。 3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人。 - 重い狭心症と医師に診断された人。 - 重い不整脈と医師に診断された人。 - 急性期脳血管障害（脳梗塞、脳出血等）と医師に診断された人。 - 本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 肝・腎機能障害にて医療機関で医師の治療を受けている人。 - うつ病の既往のある人。 - 次の部位には使用しないでください - 目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、腔等）等。 - やけど、吹出物、切り傷、炎症等皮ふに異常のある部位。 - 本剤を使用中又は使用直後はたばこを吸ったり、ニコチンガムをかんだりしないでください 1回に2枚以上貼らないでください - 本剤は次の状態のときに使用しないでください サウナ使用時、激しい運動時 - 次に該当する人はお申し出ください - 医師の治療を受けている人。・他の薬を使用している人。 - 高齢者又は20才未満の人。・本人又は家族がアレルギー体質の人。 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 絆創膏等にかぶれやすい人。 - 医師から心臓疾患〔心筋梗塞、狭心症、不整脈等〕、脳血管障害〔脳梗塞、脳出血等〕、末梢血管障害〔バージャー病等〕、高血圧、甲状腺機能亢進、褐色細胞腫、糖尿病〔インスリン製剤を使用している人〕、消化性潰瘍、肝・腎機能障害、全身性皮膚疾患〔アトピー性皮膚炎、湿疹性皮膚炎等〕、てんかん、神経筋接合部疾患〔重症筋無力症、イートン・ランバート症候群〕の診断を受けた人。・発熱している人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。