

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

アルサメック錠



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	アルサメック錠
2	成分・分量	<1錠中>シメチジン 100mg
3	用法・用量	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれた時、下記の1回服用量を、水又はお湯で服用します。 <1回服用量>成人(15才以上、80才未満) 1錠 小児(15才未満)および高齢者(80才以上)は服用しないでください <1日服用回数>3回まで ●服用後4時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1錠服用してください。 ●2回目の服用後4時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1錠服用してください。 ●症状が治まった場合は、服用を止めてください。 ●3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師にご相談ください。 ●2週間を超えて続けて服用しないでください。
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき(本剤はH ₂ ブロッカー薬を含んでいます。)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)シメチジン等のH₂ブロッカー薬によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ)を起こしたことがある人。 (2)医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。 血液の病気、腎臓・肝臓の病気、胃・十二指腸の病気、喘息・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤 (3)医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。 (4)小児(15歳未満)および高齢者(80歳以上)。 (5)妊婦又は妊娠していると思われる婦人ならびに授乳婦。 2. 本剤を服用している間は、他の胃腸薬を服用しないでください。 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4)高齢者(65歳以上)。 (5)次の症状のある人。 のどの痛み、咳および高熱、原因不明の体重減少、持続性の腹痛
6	薬剤師が必要と判断する事項	

(注意事項)

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。