

販売元： 佐藤製薬株式会社  
製造販売元： あすか製薬株式会社

イノセアワンブロック

H<sub>2</sub> ブロッカー胃腸薬

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

# イノセアワンブロック



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	イノセアワンブロック
2	成分・分量	<1カプセル中>ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 75mg
3	用法・用量	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれたとき、成人（15歳以上、80歳未満）の方は、次のとおり水又はお湯で服用してください。 <1回服用量>成人（15歳以上、80歳未満） 1カプセル 小児（15歳未満）および高齢者（80歳以上）は服用しないでください <1日服用回数> 1回 ●1回1カプセル、1日1回を限度として服用してください。 ●症状が治まった場合は、服用を止めてください。 ●3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師にご相談ください。 ●1週間を超えて続けて服用しないでください。
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき (本剤は、胃のヒスタミンH <sub>2</sub> 受容体に拮抗する薬を含んでいます。)
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください (1) ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩等のH <sub>2</sub> ブロッカー薬によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ）を起こしたことがある人。 (2) 医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。 ①血液の病気 ②腎臓・肝臓の病気 ③胃・十二指腸の病気 ④ぜんそく・リウマチ等の免疫系の病気 ⑤ステロイド剤 ⑥抗生物質 ⑦抗がん剤 ⑧アゾール系抗真菌剤 (3) 医師から赤血球数が少ない（貧血）、血小板数が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球数が少ないなどの血液異常を指摘されたことがある人。 (4) 小児（15歳未満）および高齢者（80歳以上）。 (5) 妊婦又は妊娠していると思われる女性ならびに授乳婦。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の胃腸薬 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3) 高齢者（65歳以上）。 (4) 次の症状のある人。 のどの痛み、咳および高熱、原因不明の体重減少、持続性の腹痛 <用法・用量に関連する注意> (1) 定められた用法・用量を厳守してください。 (2) 本剤を服用の際は、アルコール飲料の摂取は控えてください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。