

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ミルコデ錠A



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	ミルコデ錠A
2	成分・分量	<6錠中>テオフィリン 300mg、 <i>d</i> -メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg、 グアイフェネシン 300mg、キキョウエキス(原生薬量540mgに相当) 120mg、 セネガエキス(原生薬量500mgに相当)30mg、カンゾウエキス(原生薬量756mg に相当) 108mg
3	用法・用量	下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。 <1回服用量>成人(15才以上) 2錠、15才未満は服用しないでください <1日服用回数>3回
4	効能・効果	せき、ぜんそく、たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬</p> <p>2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (6)次の症状のある人。高熱 (7)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害</p> <p><用法・用量に関連する注意> 本剤を服用している間は、効果が弱まるおそれがありますので、セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を摂取しないでください。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。