

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

ストナリニ®ガード



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	ストナリニ・ガード
2	成分・分量	＜2錠中＞メキタジン 6mg
3	用法・用量	＜1回服用量＞成人（15歳以上） 1錠、15歳未満 服用しないでください ＜1日服用回数＞2回（朝・夕）
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください （1）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 （2）次の症状のある人。排尿困難 （3）次の診断を受けた人。緑内障 （4）15歳未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬） 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください （眠気があらわれることがあります。） 4. 服用時は飲酒しないでください 5. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください （1）医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）授乳中の人。 （4）高齢者。 （5）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （6）次の医薬品を服用している人。胃腸鎮痛鎮痙薬
6	薬剤師が必要と判断する事項	

（注意事項）

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。