副作用は？

(1) 服用後、以下の症状があらわれることがあります。このような場合は、直ちに服用を中止し、説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

関係部位	症　　状
皮　　ふ	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	腹痛、胃部不快感、食欲不振、悪心・嘔吐、腹部膨満、胸やけ、口内炎、消化不良
循 環 器	血圧上昇、動悸
精神神経系	眠気、しびれ、めまい、頭痛
そ の 他	胸痛、倦怠感、顔面のほてり、発熱、貧血、血尿

(2) まれに起こる特にご注意いただきたい副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じ時期にあらわれることが一般的です。その場合は、直ちに服用を中止し、医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症　　状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる
血 液 障 害	のどの痛み、発熱、全身のだるさ、顔やまぶたのうらが白っぽくなる、出血しやすくなる（歯茎の出血、鼻血等）、青あざができる（押しても色が消えない）等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる
腎 機 能 障 害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿・蛋白尿等があらわれる
うっ血性心不全	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる
間 質 性 肺 炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること）
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている）
ぜ ん そ く	

前記**【このお薬の服用中に気をつけなければならないことは？】**にお示しした自覚症状を、症状があらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、前記(2)特にご注意いただきたい副作用の表などをご覧下さい。

部　位	自覚症状
全　身	体温が平熱より下がる、力が出ない、全身のむくみ、からだのむくみ、冷や汗、発熱、全身のだるさ、高熱、眠気
頭　部	めまい、首すじのつっぱりを伴う激しい頭痛、頭痛、気を失う
顔　面	顔色が青白い、鼻血、ほてり
眼	まぶたのうらが白っぽい、白目が黄色くなる、結膜のただれ
耳	耳鳴り
口や喉	血を吐く、のどの痛み、歯ぐきの出血、吐き気、嘔吐、空せき（たんを伴わないせき）、口内炎、唇や口内のただれ
胸　部	胸やけ、胸が押さえられているような感じで息が苦しい、息苦しい、動悸（どうき）、息切れ、胸部の不快感、胸の痛み、呼吸がしにくい、ぜんそく
腹　部	胃もたれ、腹痛、胃の不快感、食欲不振、膨れあがる感じ、消化不良、激しい腹痛
背　中	背中の痛み
手・足	手足の冷え、しびれ
皮　膚	じんましん、青あざができる、赤い発疹、発疹や水ぶくれができる、皮膚が黄色くなる、かゆみ
便	黒いタール状の便、血が混ざった便
尿	尿量が減る、血尿、蛋白尿
その他	血圧が上がる、出血しやすい

(3) 次のような症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止して、医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわき、便秘、下痢

このお薬に含まれているものは？

有効成分	1錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物　68.1mg （無水物として　60mg）
添加物	ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、三二酸化鉄

錠剤により添加物による赤い斑点がみられることがあります

その他

○この薬の保管方法は？
- ・直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ・小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ・他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）

○外箱に記載の使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

このお薬についてのお問い合わせ先は？

○一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせ下さい。

第一三共ヘルスケア株式会社

お客様相談室
〒103−8234 東京都中央区日本橋3−14−10
電　　話：03(5205)8331
受付時間：9:00〜17:00（土、日、祝日を除く）

○症状、副作用等のより詳しい質問がある場合は、医師、歯科医師又は薬剤師にお問い合わせ下さい。

製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3−14−10
http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3．服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。