

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ストパン



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ストパン
2	成分・分量	1 カプセル中 チキジウム臭化物 5mg
3	用法・用量	15 才以上 1 回 1 カプセル 1 日 3 回まで 服用間隔は 5 時間以上おいてください。
4	効能・効果	胃痛、腹痛、さしこみ（腹部疝痛） （本剤は、胃腸の緊張をやわらげる成分を含んでいます）
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください （1）本剤又は他の胃腸鎮痛鎮痙薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 （2）次の診断を受けた人。 緑内障、前立腺肥大、心臓病、麻痺性イレウス（腸閉塞）、甲状腺機能亢進症、不整脈、潰瘍性大腸炎 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等） 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください （目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります） 4. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。 ・高齢者、体の弱っている人。 ・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・排尿困難の症状のある人。 5. 本剤の服用により汗が出にくくなることもあるため、高温下での作業等をさけてください
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。