

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

パブロンエース A X 錠



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	パブロンエース A X 錠
2	成分・分量	3錠中 イブプロフェン150mg アンブロキシソール塩酸塩15mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩2.5mg 無水カフェイン 25mg チアミン硝酸塩(ビタミンB ₁ 硝酸塩) 8mg リボフラビン(ビタミンB ₂) 4mg アスコルビン酸(ビタミンC) 166.7mg (9錠中500mg)
3	用法・用量	15才以上 1回3錠 1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。
4	効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、せき、発熱、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、たん、頭痛、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3) 15才未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気があらわれることがあります) 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 服用時は飲酒しないでください 6. 5日間を超えて服用しないでください 7. 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・高熱、排尿困難の症状のある人。 ・甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病の診断を受けた人。 ・胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病にかかったことのある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

(注意事項)

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。