

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

メディトリートクリーム



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	メディトリートクリーム
2	成分・分量	1 g 中 ミコナゾール硝酸塩 10mg
3	用法・用量	成人（15 歳以上60 歳未満）、1 日2～3 回、適量を患部に塗布してください。 ただし、 <u>3 日間</u> 使用しても症状の改善がみられないか、 <u>6 日間</u> 使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。 (1) 外陰部症状のみの場合：本剤を使用してください。腔剤（腔に挿入する薬）との併用が望まれます。 (2) 腔症状（おりもの、熱感等）を伴う場合：本剤に腔剤（腔に挿入する薬）を併用してください。
4	効能・効果	腔カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）ただし、腔症状（おりもの、熱感等）を伴う場合は、必ず腔剤（腔に挿入する薬）を併用してください。
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は使用しないでください (1) 初めて発症したと思われる人。 (2) 本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3) 15 歳未満又は60 歳以上の人。 (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5) 発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、腔からの不規則又は異常な出血、腔又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。 (6) 次の診断を受けた人。糖尿病 (7) 本疾病を頻繁に繰り返している人。（1～2 ヶ月に1 回又は6 ヶ月以内に2 回以上） (8) 腔カンジダの再発かわからない人。 2. 次の部位には使用しないでください (1) 腔周辺（外陰）以外の部位。 3. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。・授乳中の人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。