

大正製薬(株)

メディトリートクリーム

膣カンジタ再発治療薬

第一類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

## メディトリートクリーム



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	メディトリートクリーム
2	成分・分量	1g 中 ミコナゾール硝酸塩 10mg
3	用法・用量	成人(15歳以上 60歳未満)、1日 2~3回、適量を患部に塗布してください。 ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。
4	効能・効果	膣カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る) ただし、膣症状(おりもの、熱感等)を伴う場合は、必ず膣剤(膣に挿入する薬)を併用してください。
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)初めて発症したと思われる人。</p> <p>(2)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(3)15歳未満又は60歳以上の人。</p> <p>(4)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(5)発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、膣からの不規則又は異常な出血、膣又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。</p> <p>(6)次の診断を受けた人。 糖尿病</p> <p>(7)ワルファリン等の抗凝血剤を服用している人。</p> <p>(8)本疾病を頻繁に繰り返している人。(1~2カ月に1回又は6カ月以内に2回以上)</p> <p>(9)膣カンジダの再発かわからない人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください 膣周辺(外陰)以外の部位。</p> <p>3. 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人。</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>・授乳中の人。</li> </ul>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。