

販売元：大正製薬(株) 製造販売元：同仁医薬化工(株)	ジクロテクトテープL	外用鎮痛・消炎剤
--------------------------------	------------	----------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ジクロテクトテープL



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ジクロテクトテープL
2	成分・分量	膏体100g 中 ジクロフェナクナトリウム 1g
3	用法・用量	プラスチックフィルムをはがし、1日1回1枚を患部に貼ってください。 ただし、1回あたり1枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために	- 次の人は使用しないでください - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 - ぜんそくを起こしたことがある人。 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。 15才未満の小児。 - 次の部位には使用しないでください - 目の周囲、粘膜等。 - 湿疹、かぶれ、傷口。 - みずむし・たむし等又は化膿している患部。 - 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください - 連続して2週間以上使用しないでください - 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。・他の医薬品を使用している人。 ・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。 ・消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザの診断を受けた人。 ・ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤（アスピリン等）、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤の投与を受けている人。 ・高齢者。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。