

第1類医薬品



医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ダンテルモンMパスター
2	成分・分量	本品1g中 テストステロン…………… 10mg 添加物:親水ワセリン、エタノール
3	用法・容量	表皮の薄い部分や <u>その他の患部</u> ^(注) をきれいにし、1回約0.1g(小豆大)を1日1~2回、手にとつてすりこんで下さい。 <small>(注)その他の患部: 亀頭部、陰囊(睾丸)、内股など</small>
4	効能・効果	男性ホルモン分泌不足による神経衰弱諸症、男性更年期諸症、男性老衰現象の予防及び回復(快復)、恥部無毛症
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないこと (1)本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ご使用前に本剤をチューブから5mm程度出し、内股などの皮ふのうすい所にすり込んで、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状があらわれた人 (3)アンドロゲン依存性悪性腫瘍[例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性)]及びその疑いのある人 (4)女性 (5)小児(15歳未満) (6)排尿困難を伴う前立腺肥大のある人 (7)前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が2.0ng/mL以上の人(医師の判断に従うこと)。※有効成分(テストステロン)は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります。 a)特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります。 b)継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります。 c)検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談すること</p> <p>(8)睡眠時無呼吸症候群である人</p> <p>2. 次の部位には使用しないこと (1)目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔等) (2)陰茎部先端(尿道口) (3)外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位</p> <p>3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないこと</p> <p>4. 使用者以外へ付着させないこと (1)ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗って下さい。(2)本剤を使用者以外の人に付着させないように注意して下さい。付着した場合は直ちに洗い流して下さい。(3)塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流して下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい (1)医師の治療を受けている人 (2)前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人 (3)薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等)を起こしたことがある人。 (4)本人又は家族がアレルギー体質の人 (5)重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧または既往歴のある人。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。