

ロート製薬(株)	メンソレータム フレディCC クリーム	膣カンジダの再発による 外陰部症状の治療薬
----------	------------------------	--------------------------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

フレディCC クリーム



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	メンソレータム フレディCCクリーム
2	成分・分量	イソコナゾール硝酸塩 1%
3	用法・用量	成人(15歳以上 60歳未満)、1日2~3回適量を患部に塗布する。 ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けること。 (1)外陰部症状のみの場合:本剤を使用すること。ただし、膣剤(膣に挿入する薬)を併用することが望ましい。 (2)膣症状(おりもの、熱感等)を伴う場合:膣剤(膣に挿入する薬)を併用すること。
4	効能・効果	膣カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ(以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことがある人に限る。)ただし、膣症状(おりもの、熱感等)を伴う場合は、必ず膣剤(膣に挿入する薬)を併用すること。
5	保健衛生上の危害を防ぐために	1. 次の人は使用しないでください (1)以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことがない人。 (2)膣カンジダの再発を繰り返している人。(2ヶ月以内に1回又は6ヶ月以内に2回以上) (3)膣カンジダの再発かどうかよくわからない人。 (4)次の診断を受けた人。糖尿病 (5)発熱又は悪寒がある人。 (6)悪心又は嘔吐がある人。 (7)下腹部に痛みがある人。 (8)不規則な、又は異常な出血、血の混じったおりものがある人。 (9)膣又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある人。 (10)排尿痛がある人、又は排尿困難な人。 (11)ただれのひどい人。 (12)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (13)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (14)60歳以上の高齢者又は15歳未満の小児。 2. 次の部位には使用しないでください。 (1)外陰部以外の部位(爪、頭皮、目など) 【次に該当する人はお申し出ください】 ・医師の治療を受けている人。 ・授乳中の人。 ・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。