



医薬品を正しく購入するための説明文書

第1類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるように大切に保管してください。

1	名称	コンタック [®] 鼻炎Z
2	成分・分量	1錠(1日量)中 セチリジン塩酸塩 10mg
3	用法・用量	成人(15歳以上) 1回1錠、1日1回(就寝前)、水又はお湯と一緒に服用してください。 15歳未満の小児は服用しないこと。
4	効能	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分、ピペラジン誘導体(レボセチリジン、ヒドロキシジンを含む)によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2) 次の診断を受けた人。 腎臓病</p> <p>(3) 15歳未満の小児。</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等)及びテオフィリン、リトナビル又はピルシカイニド塩酸塩水和物を含有する内服薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)</p> <p>4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 服用前後は飲酒しないでください</p> <p>次に該当する方はお申し出ください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 次の診断を受けた人。 肝臓病、てんかん (3) けいれん発作を起こしたことがある人。(4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5) 高齢者。 (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。 (8) 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。</p>
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。