

販売元： 大正製薬株式会社  
製造販売元： 持田製薬株式会社

エパデールT

中性脂肪異常改善薬

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

# エパデールT



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	エパデールT
2	成分・分量	1包中 イコサペント酸エチル 600mg
3	用法・用量	次の量を食後すぐに服用してください。 20才以上 1回1包 1日3回食後すぐ 20才未満 服用しないこと
4	効能・効果	健康診断等で指摘された、境界領域注)の中性脂肪値の改善 注)「境界領域」:健康診断などにおいて中性脂肪が正常値よりもやや高めの値 (150mg/dL以上 300mg/dL未満)を指す。
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください (1)20才未満の人。 (2)出血している人。 (血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、喀血、硝子体出血等にて出血している場合、止血が困難となることがあります) (3)出血しやすい人。(出血を助長することがあります) (4)手術を予定している人。(出血を助長することがあります) (5)次の医薬品を服用している人。 ミフェプリストン及びミノプロストールを含有する人工妊娠中絶薬、ワルファリン等の抗凝固薬、アスピリンを含有するかぜ薬・解熱鎮痛薬・抗血小板薬、インドメタシンを含有する鎮痛消炎薬、チクロピジン塩酸塩やシロスタゾール等の抗血小板薬 (出血傾向が強くなることがあります) (6)脂質異常症(高脂血症)、糖尿病又は高血圧症と診断され現在医師の治療を受けている人、あるいは健康診断等で医師の治療を勧められた人。 (7)親、兄弟姉妹に原発性高脂血症と診断された人がいる人。 (8)狭心症、心筋梗塞、脳卒中と診断されたことがある人。 (9)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (10)授乳中の人。(動物試験で乳汁中への移行が認められています) 2. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。