

販売元： 大正製薬株式会社
製造販売元：バイエル薬品株式会社

クラリチンEX OD錠

アレルギー専用鼻炎薬

第一類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書



クラリチンEX OD錠

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	クラリチンEX OD錠
2	成分・分量	1錠中 ロラタジン 10mg
3	用法・用量	成人(15才以上)、1回1錠、1日1回食後に口中で溶かして服用してください。 なお、毎回同じ時間帯に服用してください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和： 鼻みず、鼻づまり、くしゃみ
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 15才未満の小児。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）、 エリスロマイシン、シメチジン 3. 服用前後は飲酒しないでください 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 次に該当する人はお申し出ください ・ 医師の治療を受けている人。 ・ 次の診断を受けた人。 肝臓病、腎臓病、てんかん ・ アレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人。 ・ 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。 ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・ 高齢者。 ・ 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。