

ロート製薬	リグロ EX5	毛髪用剤
-------	---------	------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	リグロ EX5
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5.0g
3	用法・用量	成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>（2）女性。</p> <p>（3）未成年者（20歳未満）。</p> <p>（4）壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。</p> <p>（5）脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。</p> <p>きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。</p> <p>3. 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。</p> <p>4. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。</p> <p>5. 次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>（1）今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。</p> <p>（2）高血圧の人、低血圧の人。</p> <p>（3）心臓又は腎臓に障害のある人。</p> <p>（4）むくみのある人。</p> <p>（5）家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。</p> <p>（6）高齢者（65歳以上）。</p> <p>（7）次の診断を受けている人。</p> <p>甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	<p>（ご使用にあたって）</p> <p>髪質や特定の箇所を集中塗布することで、髪がごわついたり、成分が結晶化して髪の一部が白くなる場合があります。頭皮を清潔に保つため、毎日洗髪し、用法・用量を守ってご使用ください。</p>

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。