

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

リザレックヨウ



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	リザレックヨウ										
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5g										
3	用法・用量	<p style="text-align: center;">成人男性(20歳以上)が、 1日2回、1回1mLを 脱毛している頭皮に塗布してください。</p>										
4	効能・効果	<p style="text-align: center;">壮年性脱毛症における 発毛、育毛 及び 脱毛(抜け毛)の進行予防。</p> <p style="text-align: center;"><この医薬品の対象となる壮年性脱毛症></p> <p>リザレックヨウは、以下のようなパターンの脱毛あるいは薄毛に効果があります。</p> <p style="text-align: center;">(注) 脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。</p>										
5	<p style="text-align: center;">保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p style="text-align: center;">⚠ 使用上の注意</p> <p>❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)</p> <p>1. 次の人は使用しないでください。 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 女性。(日本人女性における安全性が確認されていません。) (3) 未成年者(20歳未満)。(国内での使用経験がありません。) (4) 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。(本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。) (5) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。 (1) 本剤は頭皮のみ使用し、内服しないでください。(血圧が下がる等のおそれがあります。) (2) きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。(きず等を悪化させることがあります。)</p> <p>3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。(これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。)</p> <p>🗨 相談すること</p> <p>1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。 (1) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2) 高血圧の人、低血圧の人。(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。) (3) 心臓又は腎臓に障害のある人。(本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。) (4) むくみのある人。(むくみを増強させる可能性が考えられます。) (5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。(壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。) (6) 高齢者(65歳以上)。(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。) (7) 次の診断を受けている人。甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。(甲状腺疾患による脱毛の可能性ががあります。)</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">関係部位</th> <th style="text-align: left;">症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮 膚</td> <td>頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等</td> </tr> <tr> <td>精神神経系</td> <td>頭痛、気が遠くなる、めまい</td> </tr> <tr> <td>循環器</td> <td>胸の痛み、心拍が速くなる</td> </tr> <tr> <td>代謝系</td> <td>原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">*頭皮以外にあらわれることもあります。</p> <p>3. 6ヶ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。 脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)(壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)</p> <p>4. 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。 頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。(壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)</p> <p>その他の注意</p> <p>(1) 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも4ヶ月間、毎日使用してください。(ミノキシジルローション5%製剤の有効性は4ヶ月使用後から認められています。) (2) 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。 (3) 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。(本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。)</p> </div> </div>	関係部位	症 状	皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等	精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい	循環器	胸の痛み、心拍が速くなる	代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ
関係部位	症 状											
皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等											
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい											
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる											
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ											
6	<p style="text-align: center;">薬剤師が 必要と 判断する事項</p>	<p style="text-align: center;">—ご使用にあたって—</p> <p style="text-align: center;">お使いになる方の髪質や1ヶ所への集中塗布等により、ごわつき感が出たり、くし通りが悪くなったり、部分的に白くなる(成分の結晶化)ことがあります。毎日洗髪を行い、頭皮を清潔にして、用法・用量を守ってお使いください。</p>										

(注意事項)

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。