

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説明文書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	メンソレータム フレディ CC1
2	成分・分量	1日量(1錠中) イソコナゾール硝酸塩 600mg
3	用法・用量	成人(15歳以上 60歳未満)1回1錠(できれば、就寝前)を膣深部に挿入する。 ただし、 <u>3日間</u> 経過しても症状の改善がみられないか、 <u>6日間</u> 経過しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けること。
4	効能・効果	膣カンジダの再発。 (以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。)
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことがない人。 (2)膣カンジダの再発を繰り返している人。 (2ヶ月以内に1回又は6ヶ月以内に2回以上) (短期間に繰り返し再発する場合は、糖尿病など他の疾患の可能性も考えられる) (3)膣カンジダの再発かどうかよくわからない人。(おりものが、おかゆ(カッテージチーズ)状や白く濁った酒かす状ではない、嫌なにおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられる) (4)発熱又は悪寒がある人。 (5)吐き気又は嘔吐がある人。 (6)下腹部に痛みがある人。 (7)不規則な、又は異常な出血、血の混じったおりものがある人。 (8)膣又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある人。 (9)排尿痛がある人、又は排尿困難な人。 (10)次の診断を受けた人。糖尿病 (11)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (12)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (13)60歳以上の高齢者又は15歳未満の小児。 <p>2. 本剤を使用後6日間は、次のいずれの医薬品も外陰部に使用しないでください。 カンジダ治療薬以外の外皮用薬</p> <p>【次に該当する人はお申し出ください】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・授乳中のの人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	本剤は、1回の使用で十分な効果があるように設計されています。1回投与すると投与した薬剤が膣内に留まって徐々に効きますので、カンジダ用の膣錠或いは膣坐剤を追加で使用できません。このため、1回につき1個のみ購入が可能です。

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。