

参天製薬（株）	ヒアレインS	目薬
---------	--------	----

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

ヒアレイン[®]S



使用前には必ず添付文書をお読み下さい

1	名称	ヒアレインS						
2	成分・分量	精製ヒアルロン酸ナトリウム 0.1% 添加物として、アミノカプロン酸、エデト酸ナトリウム水和物、クロルヘキシジングルコン酸塩液、等張化剤、pH調節剤を含有します。						
3	用法・用量	1回1滴、1日5～6回点眼してください。 ●次の注意事項をお守りください。 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (2) 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁することがあります) また、混濁したものは使用しないでください。 (3) 点眼用にのみ使用してください。 (4) カラーコンタクトレンズの装着時は、使用しないでください。						
4	効能・効果	目の次の症状の緩和：乾き、異物感（コロコロ・チクチクする感じ）、疲れ、かすみ、ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感						
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>■してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる） 次の人は使用しないでください。 (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 次の診断を受けた人：ドライアイ、シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、角膜感染症 (3) 次の症状のある人：急な視力低下、はげしい目の痛み（病状が悪化する恐れがありますので、自己判断で治療をすることなく医師の診療を受けてください）</p> <p>■相談すること 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 目の症状以外に、次の症状がある人 ・口の乾燥、鼻腔の乾燥 ・高熱、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤などの持続や急激な悪化 (4) 次の診断を受けた人：緑内障 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮ふ</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> <tr> <td>目</td> <td>充血、かゆみ、はれ、痛み、刺激感、異物感、目やに</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。 (1) 目のかすみが改善されない場合 (2) 用法・用量に従い1週間くらい使用（1本目を使い切る目安）しても症状がよくなる場合や、何らかの異常が感じられた場合（2本目を使用する前にご相談ください） 4. 症状の改善が見られても、2週間を超えて使用する場合は、医師または薬剤師にご相談ください。</p>	関係部位	症状	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ	目	充血、かゆみ、はれ、痛み、刺激感、異物感、目やに
関係部位	症状							
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ							
目	充血、かゆみ、はれ、痛み、刺激感、異物感、目やに							
6	薬剤師が必要と判断する事項							

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。