

小林製薬株式会社	イラクナ	胃腸薬
----------	------	-----

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	イラクナ									
2	成分・分量	1 日 量（3 錠）中 成分 イトプリド塩酸塩 分量 1 5 0 m g									
3	用法・用量	次の量を食前に水又はお湯で服用してください <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 齢</th><th>1 回 量</th><th>服 用 回 数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人（15才以上）</td><td>1 錠</td><td>1 日 3 回</td></tr> <tr> <td>15才未満</td><td colspan="2">×服用しないこと</td></tr> </tbody> </table>	年 齢	1 回 量	服 用 回 数	大人（15才以上）	1 錠	1 日 3 回	15才未満	×服用しないこと	
年 齢	1 回 量	服 用 回 数									
大人（15才以上）	1 錠	1 日 3 回									
15才未満	×服用しないこと										
4	効能・効果	胃もたれ、胃部・腹部膨満感、食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐									
5	保健衛生上の危害を防止するために	■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる） 1. 次の人は服用しないこと （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 （2）次の症状がある人 原因不明の体重減少、繰り返す嘔吐、血便（黒いタール状の便）、発熱 （3）妊婦又は妊娠していると思われる人 （4）15才未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 消化管運動機能改善薬（モサプリドクエン酸塩水和物、アコチアミド塩酸塩水和物等）、 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、ベタネコール塩化物を含有する胃腸薬、 乗り物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬 （本剤のコリン作用を増強、もしくは減弱させるおそれがある） 3. 授乳中の人は本剤を服用しないこと （動物実験で乳汁中への移行が認められている） 4. <u>長期連用しないこと</u> ■相談すること 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること （1）医師の治療を受けている人 （2）高齢者 （3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 （4）次の診断を受けた人 腎臓病、肝臓病 （5）次の病気にかかったことのある人 胃がん、胃・十二指腸潰瘍									
6	薬剤師が必要と判断する事項										

【注意事項】

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。