

## 要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

# コルペルミン®



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	コルペルミン
2	成分・分量	1日量（3カプセル）中 セイヨウハッカ油（ペパーミントオイル）561mg
3	用法・用量	<p>成人（15歳以上）：1回1カプセルを1日3回食前又は食間に服用してください 15歳未満は服用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定められた用法・用量を守って、毎日服用してください</li> <li>・食事とともに服用することはさけてください（胸やけを起すことがあります）</li> <li>・本剤は腸溶性のカプセルですので、かんだり、つぶしたりせずに、そのまま服用してください（胸やけを起すことがあります）</li> <li>・2週間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください</li> <li>・症状の改善がみられても3ヵ月を超えて続けて服用する場合は、医師にご相談ください</li> </ul>
4	効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・過敏性腸症候群の次の諸症状の緩和：腹痛又は腹部不快感を伴い、繰り返し又は交互に現れる下痢及び便秘（以前に医師の診断・治療を受けた人に限る）</li> </ul>
5	保健衛生上の危害を防止するために	<ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないでください <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）医師から過敏性腸症候群の診断・治療を受けたことがない人</li> <li>（2）過敏性腸症候群の再発かどうかよくわからない人（例えば、今回の症状は、以前に過敏性腸症候群の診断・治療を受けた時と違う）</li> <li>（3）就寝中などの夜間にも、排便のためにトイレに行きたくなったり、腹痛がある人</li> <li>（4）発熱がある人</li> <li>（5）関節痛がある人</li> <li>（6）粘血便（下血）がある人</li> <li>（7）繰り返しひどい下痢がある人</li> <li>（8）急性の激しい下痢がある人</li> <li>（9）排便によってよくなる腹痛がある人</li> <li>（10）嘔吐がある人</li> <li>（11）6ヵ月以内に、体重が3kg以上、予期せず減少した人</li> <li>（12）次の病気にかかったことのある人 大腸がん、炎症性腸疾患（クローン病、潰瘍性大腸炎等）</li> <li>（13）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>（14）著しく胃酸が少ない状態が持続する人（無酸症）</li> <li>（15）医療機関で次の治療を受けている人 肝臓病、胆管閉塞、胆のう炎</li> </ol> </li> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 過敏性腸症候群（IBS）の症状改善薬、制酸剤</li> <li>服用前後は飲酒しないでください 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>・授乳中の人</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>・50歳以上の人</li> <li>・貧血がある人</li> <li>・次の診断を受けた人：糖尿病、甲状腺機能障害、副甲状腺機能亢進症</li> <li>・大腸がん、炎症性腸疾患の家族がいる人</li> <li>・腹痛、便秘がひどい人</li> <li>・胸やけがある人</li> </ul> </li> </ol>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。