

ゼリア新薬工業株式会社

ベルフェミン

軽度の静脈還流障害（静脈の血流が滞ること）による足のむくみ改善薬

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ベルフェミン®



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ベルフェミン
2	成分・分量	1日量(1カプセル)中 セイヨウトチノキ種子エキス552mg (セイヨウトチノキ2.65gに相当)
3	用法・用量	成人(18歳以上)、1回1カプセルを1日2回朝夕食前に服用してください 18歳未満は服用しないでください ・定められた用法・用量を守って服用してください。 ・4週間位服用しても症状が良くならない場合はご相談ください ・症状の改善が見られても12週間を越えて服用する場合はご相談ください
4	効能・効果	・軽度の静脈還流障害(静脈の血流が滞ること)による次の諸症状の改善:足(ふくらはぎ、足首など)のむくみ、むくみに伴う足のだるさ・重さ・疲れ・つっぱり感・痛み
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) 18歳未満の人</p> <p>(3) 足以外のむくみ、又は全身にむくみのある人</p> <p>(4) 足に激しい痛み、出血、色素沈着、びらんのある人。また、足の皮膚が褐色調に変化したり、硬くなった人</p> <p>(5) 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病、高血圧、腎臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、動脈硬化症</p> <p>(6) 乳癌、子宮癌等の手術(リンパ節切除)や放射線治療を受けたことがある人</p> <p>(7) 抗血小板剤(アスピリン、チクロピジン塩酸塩等)、抗凝血剤(ワルファリン、ヘパリン等)、血栓溶解剤(ウロキナーゼ等)で治療を受けている人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください アスピリンを含有するかぜ薬・解熱鎮痛薬</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none">・医師の治療を受けている人・高齢者・妊娠又は妊娠していると思われる人・授乳中の人・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人・次の症状がある人:息切れ、動悸、倦怠感、黄疸、尿量減少、血尿、貧血
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。