製造販売元： 第一三共ヘルスケア株式会社	ロキソニン総合かぜ薬	総合感冒薬

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための

説　明　文　書

ロキソニン® 総合かぜ薬

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名　称	ロキソニン総合かぜ薬
2	成分・分量	【６錠中】 ロキソプロフェンナトリウム水和物　　２０４．３ｍｇ（無水物として１８０ｍｇ） ジヒドロコデインリン酸塩　　２４ｍｇ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩　　６０ｍｇ ブロムヘキシン塩酸塩　　１２ｍｇ クレマスチンフマル酸塩　　１．３４ｍｇ （添加物） Ｄ−マンニトール、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースＮａ、ステアリン酸Ｍｇ、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ
3	用法・用量	成人（１５歳以上）１回２錠　１日３回　食後なるべく３０分以内に水又はお湯で服用してください。 １５歳未満は服用しないでください。
4	効能・効果	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください。 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15 歳未満の小児 (4) 医療機関で次の治療を受けている人 胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、心臓病 (5) 医師から赤血球数が少ない（貧血）、血小板数が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球数が少ない等の血液異常（血液の病気）を指摘されている人 (6) 出産予定日 12 週以内の妊婦 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等） 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 5. 服用前後は飲酒しないでください。 6. 5 日間を超えて服用しないでください。 次に該当する人はお申し出ください。 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人　高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、緑内障、気管支ぜんそく、潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 (7) 次の病気にかかったことのある人 胃・十二指腸潰瘍、肝臓病、腎臓病、血液の病気

６	薬剤師が 必要と 判断する事項	

〔注意事項〕

１．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。

２．法令により、要指導医薬品は必ず、第１類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。

３．服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。