

製造販売元：  
第一三共ヘルスケア株式会社

トランシーノEX

しみ（肝斑に限る）

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	トランシーノEX
2	成分・分量	<b>【4錠中】</b> トラネキサム酸 750mg L-システイン 240mg アスコルビン酸（ビタミンC） 300mg ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6） 6mg パントテン酸カルシウム 24mg ニコチン酸アミド 40mg （添加物） 乳酸Ca、セルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、三二酸化鉄、カルナウバロウ
3	用法・用量	成人（15歳以上）1回2錠 1日2回 食後に水又はお湯で服用してください。 15歳未満は服用しないでください。
4	効能・効果	しみ（肝斑に限る）
5	保健衛生上の危害を防止するために	次の人は、このお薬を服用することは出来ません。 ◇透析療法を受けている人（けいれんがあらわれることがあります） ◇トラネキサム酸を含有する内服薬を服用している人 ◇15歳未満の小児 次の人は、このお薬を服用する際に注意が必要です。購入される前に医師又は薬剤師にご相談ください。 ◇医師又は歯科医師の治療を受けている人 ◇妊婦又は妊娠していると思われる人 ◇授乳中の人 ◇55歳以上の人 ◇薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ◇血栓症のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎、肺塞栓症等） ◇血栓症を起こすおそれのある人 ●以前に血栓症にかかったことがある人 ●家族が血栓症を起こした人 ●医師から先天性の凝固異常症を指摘されたことがある人 ●経口避妊薬・ホルモン補充療法などの血栓症を起こすおそれのある薬を服用している人 ◇次の診断を受けた人 腎臓病 ご自分のしみが、本剤の効能・効果である肝斑かどうかの識別が難しい場合、また、色が黒ずんでおり、色調が不均一で、表面が隆起したようなしみ状のものがある場合は専門の皮膚科医に相談してください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。