

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説明文書リザレックコーワ
for Lady

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名称	リザレックコーワ for Lady										
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 1.0g / パントテニールエチルエーテル 1.0g / トコフェロール酢酸エステル 0.08g / -メントール 0.3g										
3	用法・用量	<p style="text-align: center;">用法・用量</p> <p style="text-align: center;">成人女性(20歳以上)が、 1日2回、1回1mLを 脱毛している頭皮に塗布してください。</p> <p>用法・用量を守り、効果がわかるようになるまで少なくとも6ヶ月間、毎日使用してください。効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。又、毛髪が成長する程度には個人差があり、誰にでも効果があるわけではありません。以上の内容を十分ご理解の上、ご購入ください。</p> <p style="text-align: right;"><注意></p> <p>(1)用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)</p> <p>(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。</p> <p>(3)薬液のついた手で、目の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。</p> <p>(4)髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。</p> <p>(5)アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネ枠、化学繊維等)にはつかないようにしてください。</p> <p>(6)整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。</p> <p>(7)染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。</p> <p>(8)つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。</p>										
4	効能・効果	<p style="text-align: center;">効能・効果</p> <p style="text-align: center;">壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。</p> <p style="text-align: right;"><この医薬品の対象となる壮年性脱毛症></p>  <p style="text-align: center;">図よりも脱毛している場合には、効果が得られない可能性があります。</p>										
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p style="text-align: center;">⚠ 使用上の注意</p> <p>❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)</p> <p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)20歳未満の人。 (国内での使用経験がありません。)</p> <p>(3)妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。 (妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。又、ミノキシジルは母乳中に移行します。)</p> <p>(4)妊娠、出産に伴い脱毛している人。 (壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)</p> <p>(5)避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。 (壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)</p> <p>(6)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 (本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。)</p> <p>(7)頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。 (男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)</p> <p>(8)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 (壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)</p> <p>(9)頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。 (壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)</p> <p>(10)男性。 (本剤は女性用の製品であるため、男性は使用しないでください。)</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。</p> <p>(1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 (血圧が下がる等のおそれがあります。)</p> <p>(2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。 (きず等を悪化させることがあります。)</p> <p>3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。 (これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。)</p> <p>📄 相談すること</p> <p>1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。</p> <p>(1)今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2)高血圧の人、低血圧の人。 (本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)</p> <p>(3)心臓又は腎臓に障害のある人。 (本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。)</p> <p>(4)むくみのある人。 (むくみを増強させる可能性が考えられます。)</p> <p>(5)家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 (壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。)</p> <p>(6)高齢者(65歳以上)。 (一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。)</p> <p>(7)次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。 (甲状腺疾患による脱毛の可能性ががあります。)</p> <p>2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、製品に同封している添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等</td> </tr> <tr> <td>精神神経系</td> <td>頭痛、気が遠くなる、めまい</td> </tr> <tr> <td>循環器</td> <td>胸の痛み、心拍が速くなる</td> </tr> <tr> <td>代謝系</td> <td>原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">*頭皮以外にあらわれることもあります。</p> <p>3. 6ヶ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、製品に同封している添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。 脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)</p> <p>4. 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、製品に同封している添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。 頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭皮以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)</p>	関係部位	症状	皮膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等	精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい	循環器	胸の痛み、心拍が速くなる	代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ
関係部位	症状											
皮膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等											
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい											
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる											
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ											

その他の注意


- (1) 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヶ月間、毎日使用してください。
(本剤の有効性は6ヶ月間使用した場合に認められています。)
- (2) 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
- (3) 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。
(本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

リザレックユー for Lady セルフチェックシート

以下の項目にあてはまる方はにチェックを記入してください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>	①使用しないでください。	男性である。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>	⑤使用しないでください。 (本剤は女性用です。)	
20歳未満である。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>	②使用しないでください。 (国内での使用経験がありません。)	頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>	⑥きず、湿疹あるいは炎症(発赤)を治してから再確認してください。 (きず等を悪化させることがあります。)	
妊娠又は妊娠していると思われる、又は授乳中である。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>	③使用しないでください。 (妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。又、ミノキシジルは母乳中に移行します。)	右図よりも脱毛している。  ▼No	Yes <input type="checkbox"/>	⑦使用しないか、使用する前に医師又は薬剤師に相談してください。 (壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)	
妊娠、出産に伴い脱毛している。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>	④使用しないでください。 (壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)	家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>	⑧使用を控えられることをおすすめします。使用する場合は、必ず医師又は薬剤師に相談してください。 (本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)	
避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		高血圧・低血圧で現在治療を受けている。狭心症等、心臓に障害がある。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		
頭髪が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部位が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある。高血圧又は低血圧である。心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		⑨使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
頭髪以外の体毛(まゆ毛等)が脱毛している。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		⑩使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。)
急激なダイエットにより脱毛してきた。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		65歳以上である。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		⑪一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。
頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		チェック項目のいずれにも該当しない。又は⑦~⑩について医師又は薬剤師に相談済みである。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>		リザレックユー for Ladyを使用できます。使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みになり、ご購入ください。
頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>					
急激に脱毛している。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>					
髪を頭皮から強く引っ張るような髪型により脱毛している。 ▼No	Yes <input type="checkbox"/>					

▼No 次のページの項目に続く

このお薬についてのお問い合わせ先

このお薬についてのご相談又はお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL: 03-3279-7755 FAX: 03-3279-7566
電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



発売元
興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



製造販売元
リョートファイン株式会社
千葉県船橋市高田1-110番地

- ご購入の前に、ご自身が「リザレックユー for Lady」の使用に適しているか、「セルフチェックシート」で確認してください。
- 「リザレックユー for Lady」をご購入の際は、このシートを薬剤師へお渡しになり、「セルフチェックシート」の確認及び説明を受けてください。
- ご使用に際しては、製品に同封している添付文書や使用者向け情報提供資料をよくお読みになり、正しくお使いください。

薬剤師が必要と判断する事項

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。