

製造販売元：アリナミン製薬株式会社	タケプロン s	胃腸薬
-------------------	---------	-----

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

タケプロン®S



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	タケプロン s
2	成分・分量	1 錠(1 日服用量)中 ランソプラゾール 15mg 添加物: アスパルテーム(Ｌ-フェニルアラニン化合物) ※その他の添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	15 歳以上 1 回 1 錠、1 日 1 回、口中で崩壊させて服用するか、水またはお湯で服用 ・2 週間を超えて服用しない
4	効能・効果	胸やけ、もたれ、胃痛(本剤は胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬を含んでいます)
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないで下さい (1) 本剤または本剤の成分により、アレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 次の医薬品を服用している人 HIV 感染症治療薬(アタザナビル硫酸塩、リルピビルリン塩酸塩) 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい 他の胃腸薬、テオフィリンを含有する内服薬(鎮咳去痰薬、乗物酔い薬)、酸化マグネシウムを含有する内服薬(瀉下薬等) 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい 4. 他のプロトンポンプ阻害薬の使用期間も合わせて 2 週間を超えて続けて服用しないで下さい(重大な消化器疾患を見過ごすおそれがあるので、医師の診察を受けること) 次に該当する人はお申し出下さい ・医師の治療を受けている人 ・妊婦または妊娠していると思われる人 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 原因不明の体重減少、持続性の胃痛・腹痛 ・次の診断を受けた人 肝臓病、胃・十二指腸潰瘍、フェニルケトン尿症
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第 1 類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。