

販売元： ロート製薬（株）
製造販売元： ロート製薬（株）

ロートアルガードエピナスチン点眼薬

眼科用薬

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ロートアルガード®

エピナスチン点眼薬



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ロートアルガードエピナスチン点眼薬
2	成分・分量	有効成分：エピナスチン塩酸塩：0.05% 添加物として、塩化Na、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、ホウ酸、エデト酸Na、 pH調節剤を含有する。
3	用法・用量	1回1滴、1日4回（朝、昼、夕方及び就寝前）点眼してください。 <用法及び用量に関連する注意> （1）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 （2）目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。 （3）容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入（目やにやホコリなど）の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。 （4）コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。 （5）点眼用에만使用してください。 （6）用法・用量を厳守してください。 （7）花粉など季節性のアレルギーによる症状に使用する場合は、花粉飛散開始の1～2週間前から、又は花粉の飛散期に入って症状が出始めた時、症状の軽い早めの時期からの使用が効果的です。 （8）点眼後1～5分間、目を閉じて目頭を軽く手で押さえてください。 （9）他の目薬と併用するときは、少なくとも5分以上間隔をあけてください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、 目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は使用しないでください。 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 次の人は、使用前に医師又は薬剤師に相談してください。 （1）医師の治療を受けている人 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人 （3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 （4）減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人 （5）アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児 （6）次の症状のある人 はげしい目の痛み、強い異物感 （7）眼球乾燥症候群（ドライアイ）の診断を受けた人又はその恐れがある人 （8）アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人 とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるため、 使用前に医師又は薬剤師に相談してください。 ●片方の目だけに症状がある場合 ●目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合 ●視力が低下した場合 ●黄緑色など色がついた粘り気がある目やにの多い場合
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。