

販売元：ホールジャパンドラッグ（株）
製造販売元：キョーリンリメディオ（株）

ガスドック10

H₂ブロッカー胃腸薬

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ガスドック10



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ガスドック10
2	成分・分量	1錠中 ファモチジン 10mg
3	用法・用量	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれた時、成人（15歳～80歳未満）1回量1錠を服用してください。1日服用回数2回まで。 ・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1錠服用してください。 ・症状が治まった場合は、服用を止めてください。 ・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談してください。 ・2週間を超えて続けて服用しないでください。
4	効能・効果	胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は服用しないでください (1) ファモチジン等のH ₂ ブロッカー薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。血液の病気、腎臓・肝臓の病気、心臓の病気、胃・十二指腸の病気、喘息・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤 (3) 医師から赤血球が少ない、血小板数が少ない、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。 (4) 小児（15歳未満）及び高齢者（80歳以上）。 (5) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人並びに授乳婦。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の胃腸薬 次に該当する人はお申し出下さい。 (1) 医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 高齢者。 (5) 次の症状のある人。のどの痛み、咳及び高熱、原因不明の体重減少、持続性の腹痛
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。