

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	アクチビア®軟膏
2	成分・分量	1 g 中 アシクロビル 50 mg
3	用法・用量	1日3～5回、適量を患部に塗布する。（唇やそのまわりにピリピリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布する）
4	効能・効果	口唇ヘルペスの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. アクチビア軟膏が使用できるかどうかを確認してください（以下の項目に該当する場合は本剤を使用することができません。医師の治療を受けてください。）</p> <p><input type="checkbox"/> 過去に、病院で口唇ヘルペスと診断されたことがない。</p> <p><input type="checkbox"/> こういう症状が初めてである。</p> <p><input type="checkbox"/> 患部が広範囲である。</p> <p><input type="checkbox"/> 水疱（水ふくれ）が大きい（小豆大）。</p> <p><input type="checkbox"/> 頭痛や、ひどい痛みがある。</p> <p><input type="checkbox"/> アシクロビルまたはバラシクロビル塩酸塩製剤にアレルギー症状を起こしたことがある。</p> <p><input type="checkbox"/> 使用者は6歳未満の乳幼児である。</p> <p><input type="checkbox"/> 患部が唇とそのまわりをのぞく部位である。</p> <p>次に該当する方はお申し出ください。</p> <p>（1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>（3）授乳中の人。 （4）本人又は家族がアレルギー体質の人。</p> <p>（5）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>（6）湿潤やただれがひどい人。 （7）アトピー性皮膚炎の人。</p> <p>●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。</p> <p>●目に入らないように注意してください。外用のみに使用してください。</p> <p>●口に入っても害はありませんが、なるべく口に入れたり、なめたりしないでください。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。 -11-