

販売元： 佐藤製薬株式会社
製造販売元： 佐藤製薬株式会社

エンペシドL

膣カンジダ用薬

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

エンペシド®L



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	エンペシドL
2	成分・分量	<1錠中>クロトリマゾール 100mg
3	用法・用量	次の量を膣深部に挿入してください。6日間毎日続けて使用してください。 <1回使用量>成人(15歳以上60歳未満) 1錠 15歳未満及び60歳以上は、使用しないでください。 <1日使用回数>1回(できれば就寝前) ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、 <u>6日間</u> 使用しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けてください。
4	効能・効果	膣カンジダの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために	1. 次の人は使用しないでください (1)初めて発症したと思われる人。 (2)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)15歳未満又は60歳以上の人。 (4)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5)発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、膣からの不規則又は異常な出血、膣又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。 (6)次の診断を受けた人。糖尿病 (7)本疾病を頻繁に繰り返している人。(1~2カ月に1回又は6カ月以内に2回以上) (8)膣カンジダの再発かわからない人。 2. 次の部位には使用しないでください (1)膣内以外の部位。 3. 本剤を使用中に次の医薬品を外陰部に使用しないでください (1)カンジダ治療薬以外の外皮用薬。 次に該当する人はお申し出ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (3)授乳中の人。 生理中は使用しないでください。使用中に生理になった場合は使用を中止してください。その場合は治癒等の確認が必要であることから、医師の診療を受けてください。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。