

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	アネトンせき止め顆粒
2	成分・分量	4包<1包 1.5g>(成人 1日量)中 コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン) 60mg、 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 40mg、テオフィリン 160mg、 グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg
3	用法・用量	成人(15歳以上)1回1包、12歳以上15歳未満1回2/3包を1日3回、食後に水 又はお湯で服用、さらに就寝前に1回服用することができる。
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内 服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>5. 過量服用・長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・発熱している小児 ・けいれんを起こしたことがある小児 ・高齢者 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の症状のある人 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てん かん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください】 【本剤を服用している間は、効果が弱まるおそれがありますので、セイヨウオトギリソ ウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を摂取しないでください】</p>
6	薬剤師が必要 と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。

【2017.7】