

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

ニチブロック10



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 名 称 | ニチブロック10 |
| 2 | 成分・分量 | 1錠中 ファモチジン10mg |
| 3 | 用法・用量 | 胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれた時、下記の1回の量を、水又はお湯で服用してください。 ・成人（15歳以上、80歳未満）：1回量1錠（1日服用回数2回まで8時間以上あける） ・小児（15歳未満）、高齢者（80歳以上）：服用しないでください ・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1錠服用してください。・症状が治まった場合は、服用を止めてください。・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談してください。・2週間を超えて続けて服用しないでください。 |
| 4 | 効能・効果 | 胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき（本剤はH ₂ ブロッカー薬を含んでいます） |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために | <p>1. 次の人は服用しないでください</p> <p>（1）ファモチジン等のH₂ブロッカー薬によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ）を起こしたことがある人。</p> <p>（2）医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。 血液の病気、腎臓・肝臓の病気、心臓の病気、胃・十二指腸の病気、喘息・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤</p> <p>（3）医師から赤血球数が少ない（貧血）、血小板数が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。</p> <p>（4）小児（15歳未満）及び高齢者（80歳以上）。</p> <p>（5）妊婦又は妊娠していると思われる婦人並びに授乳婦</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の胃腸薬</p> <p>■次に該当する人はお申し出下さい■</p> <p>（1）医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。（2）本人又は家族がアレルギー体質の人。（3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。（4）高齢者（65歳以上）。（一般に高齢者は、生理機能が低下していることがあります。）（5）次の症状のある人。のどの痛み、咳及び高熱（これらの症状のある人は、重篤な感染症の疑いがあり、血球数減少等の血液異常が認められることがあります。服用前にこのような症状があると、本剤の服用によって症状が増悪し、また、本剤の副作用に気づくのが遅れることがあります。）原因不明の体重減少、持続性の腹痛（他の病気が原因であることがあります。）</p> |
| 6 | 薬剤師が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。