

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書アシノンZ[®]

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	アシノンZ (カプセル/錠/胃腸内服液)
2	成分・分量	1 (カプセル/錠/瓶) 中 ニザチジン 75mg
3	用法・用量	<p>胸やけ、むかつき、胃痛、もたれの症状があらわれた時、下記の1回の量を服用してください 成人 (15才以上、80才未満) 1回量1 (カプセル/錠/瓶)、1日服用回数2回まで</p> <ul style="list-style-type: none"> ・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1 (カプセル/錠/瓶) 服用してください ・症状が治まった場合は、服用を止めてください ・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談してください ・2週間を超えて続けて服用しないでください
4	効能・効果	胸やけ、むかつき、胃痛、もたれ
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は服用しないでください</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ニザチジン等のH₂ブロッカー薬によりアレルギー症状 (例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ) を起こしたことがある人 (2) 医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人 血液の病気、腎臓・肝臓の病気、胃・十二指腸の病気、ぜんそく・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤 (3) 医師から赤血球数が少ない (貧血)、血小板数が少ない (血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人 (4) 小児 (15才未満) 及び高齢者 (80才以上) (5) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人並びに授乳婦 <p>2. 本剤を服用している間は、他の胃腸薬を服用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 高齢者 (65才以上) (5) のどの痛み、咳及び高熱のある人 (6) 原因不明の体重減少、持続性の腹痛のある人
6	薬剤師が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。 -35-