

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

リアッププラス



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	リアッププラス
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 1.0g パントテニールエチルエーテル 1.0g トコフェロール酢酸エステル 0.08g l-メントール 0.3g
3	用法・用量	成人男性（20 歳以上）が、1日2回、1回1mL を脱毛している頭皮に塗布する。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1) 未成年者（20 歳未満）。</p> <p>(2) 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。</p> <p>(3) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。</p> <p>(4) 女性。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。</p> <p>(2) きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。</p> <p>3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。</p> <p>4. 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 ・今までに薬や化粧品によるアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。 ・高齢者（65 歳以上）。 ・高血圧の人、低血圧の人。 ・心臓又は腎臓に障害のある人。 ・甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の診断を受けている人。 ・むくみのある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。