

販売元 大木製薬(株) 製造販売元 大東製薬工業(株)	ガラナポーン	勃起障害・射精障害改善薬
--------------------------------	--------	--------------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ガラナポーン
2	成分・分量	3錠(300mg)中 ヨヒンビン塩酸塩 15mg
3	用法・用量	大人 1錠 1日 3回服用する。小児は用いず
4	効能・効果	老衰性陰萎、衰弱性射精、神経衰弱性陰萎
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>*してはいけないこと</p> <p>1、つぎの人は服用しないこと 1)小児、2)女性、3)低血圧症または高血圧症の人、4)心臓、肝臓、腎臓に疾患のある人、5)泌尿器、生殖器に炎症がある人、6)アレルギー症状を起こしたことがある人、7)消化器に急性又は慢性の疾患がある人</p> <p>2、服用後の乗物又は機械の操作をしないこと 3、同じ成分の医薬品を服用しないこと</p> <p>4、服用時は飲酒しないこと 5、空腹時の服用</p> <p>*相談すること</p> <p>1、治療中の人、他の薬を使用している人、心臓、肝臓、腎臓に既往歴のある人、アレルギー症状を起こしたことがある人、アレルギー体質の人は、服用前に医師または薬剤師に相談すること</p> <p>2、服用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみなどの症状、胃痛、腹部膨満感、吐き気の症状、めまい、発汗、虚脱感、血圧の増大、どうき、唾液分泌過多、ほてり、目の充血の症状があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談すること</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。