

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ガラナポーン
2	成分・分量	本品3錠(300mg)中 ヨヒンビン塩酸塩 15mg を含有する。
3	用法・用量	大人1回1錠1日3回服用する。小児は用いず。
4	効能・効果	老衰性陰萎、衰弱性射精、神経衰弱性陰萎。
5	保健衛生上の危害を防止するために	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないこと <ol style="list-style-type: none"> 小児。 女性。 低血圧症または高血圧症の人。 心臓、肝臓、腎臓に疾患のある人。 泌尿器、生殖器に炎症のある人。 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 消化器に急性または慢性の疾患のある人。 服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないこと 本剤を服用している間は、同じ成分を含んだその他の医薬品を服用しないこと 服用時は飲酒しないこと 空腹時の服用はお止めください。 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること <ol style="list-style-type: none"> 現在、医師の治療を受けている人。 他の薬を使用している人(他の薬に影響を与えることがあります)。 心臓、肝臓、腎臓に既往歴のある人。 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等)を起こしたことがある人。 本人または家族がアレルギー体質の人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。