

## 第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための  
説明文書オキナゾール<sup>®</sup> L100

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。



1	名称	オキナゾール L 100
2	成分・分量	成分 (1錠中) オキシコナゾール硝酸塩 100mg
3	用法・用量	成人(15才以上60才未満) 1日1回1錠を膣深部に挿入してください(就寝前が望ましい)。6日間連続して使用してください。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合には医師の診療を受けてください。
4	効能・効果	膣カンジダの再発(以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。)
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことがない人。</li> <li>(2) 膣カンジダの再発を繰り返している人(2ヵ月以内に1回又は6ヵ月以内に2回以上)(短期間に繰り返し再発する場合は、糖尿病など他の疾患の可能性も考えられます)。</li> <li>(3) 膣カンジダの再発かどうかよくわからない人【おりものが、おかゆ(カッテージチーズ)状、白く濁った酒かす状ではない、いやなにおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられます】。</li> <li>(4) 発熱、悪寒がある人。</li> <li>(5) 吐き気、嘔吐がある人。</li> <li>(6) 下腹部に痛みがある人。</li> <li>(7) 背中や肩に痛みがある人。</li> <li>(8) 不規則な出血又は異常な出血、血の混じったおりものがある人。</li> <li>(9) 膣又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある人。</li> <li>(10) 排尿痛がある人又は排尿困難な人。</li> <li>(11) 次の診断を受けた人。 糖尿病</li> <li>(12) ワルファリン等の抗凝血薬を使用している人。</li> <li>(13) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>(14) 妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>(15) 15才未満の小児又は60才以上の高齢者。</li> </ul> <p>2. 本剤を使用中は、次の医薬品を外陰部に使用しないでください。 カンジダ治療薬以外の外皮用薬</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人。</li> <li>・授乳中の人。</li> <li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> </ul>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。