

発売元：小林製薬(株) 製造販売元：田辺三菱製薬(株)	フェミニーナ 膣カンジダ錠	膣カンジダ再発治療薬
--------------------------------	---------------	------------

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	フェミニーナ 膣カンジダ錠 (膣錠)
2	成分・分量	1日量(1錠)中 オキシコナゾール硝酸塩:100mg
3	用法・用量	成人(15才以上60才未満)1日1回1錠を膣深部に挿入する(就寝前が望ましい) 6日間連続して使用すること。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合には医師の診療を受けること
4	効能・効果	膣カンジダの再発(以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る)
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないこと</p> <p>①以前に医師から膣カンジダの診断・治療を受けたことがない人 ②膣カンジダの再発までの期間が2ヶ月以内の人、または2ヶ月以上であっても、直近6ヶ月以内に2回以上感染した人③膣カンジダの再発かどうかよくわからない人(おりものが、おかゆ(カッテージチーズ)状、白く濁った酒かす状ではない、いやなおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられる) ④発熱、悪寒がある人 ⑤悪心、嘔吐がある人 ⑥下腹部に痛みがある人 ⑦背中や肩に痛みがある人 ⑧不規則な出血または異常な出血、血の混じったおりものがある人 ⑨膣または外陰部に潰瘍、水膨れまたは痛みがある人 ⑩排尿痛がある人または排尿困難な人 ⑪次の診断を受けた人:糖尿病 ⑫ワルファリンなどの抗凝血薬を使用している人 ⑬本剤の成分に対しアレルギー症状を起こしたことがある人 ⑭妊婦または妊娠していると思われる人 ⑮15才未満の小児または60才以上の高齢者</p> <p>2. 本剤を使用中は、次の医薬品を外陰部に使用しないこと</p> <p><u>フェミニーナ軟膏Sなどカンジダ治療薬以外の外皮用薬</u></p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。