

販売元：ノバルティスファーマ(株)  
製造販売元：同仁医薬化工(株)

ボルタレン AC (ゲル/ローション)

経皮鎮痛消炎剤

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

# ボルタレン<sup>®</sup> AC



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ボルタレン AC (ゲル/ローション)
2	成分・分量	(ゲル/ローション) 1g 中 ジクロフェナクナトリウム 10mg
3	用法・容量	(ゲル/ローション) 1日 3~4 回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために	(ゲル/ローション) 1. 次の人は使用しないでください。 (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15才未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください。 (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 皮ふの弱い部位(顔、頭、わきの下等) (3) 湿疹、かぶれ、傷口 (4) みずむし・たむし等又は化膿している患部 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。 4. 長期連用しないでください。 次に該当する人はご相談ください。 ○ 医師の治療を受けている人 ○ 本人又は家族がアレルギー体質の人 ○ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ○ ニューキノロン系抗菌剤の投与を受けている人
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 服用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。