

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書劇
ハンビロン

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	劇 ハンビロン (カプセル)
2	成分・分量	1 (カプセル) 中 塩酸ヨヒンビン 6mg、硝酸ストリキニーネ 0.5mg、反鼻末 153.5mg、パントテン酸カルシウム 50mg 添加物としてカプセルにゼラチン、赤色3号、黄色4号 (タートラジン)、青色1合、酸化チタン硫酸 Na 及び亜硫酸水素 Na を含有する。
3	用法・用量	成人は1日1回1カプセルを服用してください。
4	効能・効果	神経衰弱性陰萎、老衰性陰萎、衰弱性射精
5	保健衛生上の危害を防止するために	<ol style="list-style-type: none"> 次の方は服用しないで下さい。 <ol style="list-style-type: none"> 心臓及び血管系に障害のある人 血圧が90/50mmHgより低い人 生殖器系に障害がある人 脳梗塞、脳出血等や心筋梗塞を起こして6ヶ月以上経っていない人 本剤を服用してアレルギー症状 (例えば発熱・発赤、かゆみ等) を起こしたことがある人 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 他の勃起不全治療剤
6	薬剤師が必要と判断する事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。 <ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人 高血圧の人 持病のある人、体の弱っている人または高熱のある人 高齢者 本人又は家族がアレルギー体質の人 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 次の場合には、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。 <ol style="list-style-type: none"> 服用後、次の症状があらわれた場合 [関係部位：症状] 皮ふ：発疹・発赤、かゆみ 消化器：悪心・嘔吐、食欲不振、嚥下困難 精神神経系：頭痛、めまい、疲労 その他：ぜんそく、筋肉の硬直、筋痛 まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は、直ちに医師の診療を受けて下さい。 [症状の名称：症状] ショック (アナフィラキシー)：服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 1ヶ月服用しても症状が良くならない場合 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。 口のかわき

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。