

販売元：(株)メイクトモロー
製造販売元：松田薬品工業(株)

ストルピンMカプセル

精力増強剤（ヨヒンビン製剤）

要指導医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

ストルピンMカプセル



使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	ストルピンMカプセル
2	成分・分量	1カプセル（0.15g）中 塩酸ヨヒンビン6mg，ガラナエキス25mg，反鼻末20mg その他、添加物として、バレイショデンプン、乳糖水和物及びアラビアゴム末を含有する。 また、カプセル剤皮中添加物として、青色1号、赤色3号、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、酸化チタンを含有する。
3	用法・用量	1回1カプセル 1日3回服用してください。
4	効能・効果	神経衰弱性陰萎、衰弱性射精、老衰性陰萎
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>してはいけないこと</p> <ol style="list-style-type: none">次の人は使用しないでください (1) 本剤又は他のヨヒンビン製剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 現在、他のヨヒンビン製剤を服用している人。 (3) 15歳未満の小児本剤を服用している間は次の医薬品を服用しないでください 他のヨヒンビン製剤服用時は飲酒しないでください <p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none">次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください (1) 下腹部臓器の慢性炎症、泌尿生殖器の炎症のある人又は排尿困難な人。 (2) 心臓に障害のある人又は血圧の高い人。 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる女性。 (4) 医師の治療を受けている人。 (5) 次の診断を受けた人。糖尿病次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください (1) 本剤の服用により、頭痛、悪心・嘔吐、手指のふるえ、首すじのしびれ、激しい動悸、のぼせ等の症状があらわれた場合。 (2) しばらく服用しても症状の改善がみられない場合。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。