

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書フレディ[®]CC錠

使用前には必ず添付文書をお読み下さい。

1	名 称	メンソレータム フレディCC錠
2	成分・分量	1日量（1錠中） イソコナゾール硝酸塩 100mg
3	用法・用量	成人（15歳以上60歳未満）1日1回（できれば、就寝前）、1錠を膣深部に挿入する。 6日間毎日続けて使用すること。 ただし、 3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は医師の診療を受けること。
4	効能・効果	膣カンジダの再発。 (以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。)
5	保健衛生上の危害を防止するために	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことがない人。</p> <p>(2)膣カンジダの再発を繰り返している人。 (2ヶ月以内に1回又は6ヶ月以内に2回以上)</p> <p>(3)膣カンジダの再発かどうかよくわからない人。(おりものが、おかゆ(カッテージチーズ)状や白く濁った酒かす状ではない、嫌なにおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられる)</p> <p>(4)次の診断を受けた人。糖尿病</p> <p>(5)発熱又は悪寒がある人。</p> <p>(6)悪心又は嘔吐がある人。</p> <p>(7)下腹部に痛みがある人。</p> <p>(8)不規則な、又は異常な出血、血の混じったおりものがある人。</p> <p>(9)膣又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある人。</p> <p>(10)排尿痛がある人、又は排尿困難な人。</p> <p>(11)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(12)妊婦又は妊娠していると思われる人。</p> <p>(13)60歳以上の高齢者又は15歳未満の小児。</p> <p>2. 本品を使用している間は、次のいずれの医薬品も外陰部に使用しないでください。 カンジダ治療薬以外の外皮用薬</p> <p>【次に該当する人はお申し出ください】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・授乳中の人。 ・本人又は家族がアレルギー体質の人。 ・薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 服用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には服用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。